

El seguiment de senglar al Montnegre i el Corredor i a la Serralada Litoral Central

FERRAN NAVÀS,¹ CARME ROSELL,² ROSER LOIRE³ i MIREIA VILA³

¹Minuartia, Estudis Ambientals

²Departament de Biologia Animal. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

³Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona

Resum

Els parcs del Montnegre i el Corredor, de la Serralada Litoral i de la Serralada de Marina formen part de la xarxa d'observatoris del Programa de seguiment de senglar a Catalunya. En el marc d'aquest programa s'analitzen les dades de totes les batudes organitzades i que enregistren caçadors voluntaris de 23 colles senglaïeres. Els principals resultats que s'obtenen són: pressió de caça, participació en les caceres, efectivitat, captures per batuda i unitat de superfície, i evolució i estima de la densitat. Aquest conjunt de paràmetres permet un seguiment de les tendències demogràfiques a cada espai. La densitat mostra una tendència ascendent tant al Montnegre i el Corredor com a la Serralada Litoral, d'igual manera que a tots els observatoris del nord de Barcelona i Girona. Les dades de la temporada 2014-2015 mostren diferències entre els tres espais: 4 senglars/km² a la Serralada de Marina, 9 senglars/km² a la Serralada Litoral i 10 senglars/km² al Montnegre i el Corredor; aquestes diferències probablement estan relacionades amb les diferències en els hàbitats.

Paraules clau

Senglar, seguiment poblacional, parcs naturals, Diputació de Barcelona

Resumen

El seguimiento de jabalí en el Montnegre i el Corredor y en la Serralada Litoral Central

Los parques del Montnegre i el Corredor, de la Serralada Litoral y de la Serralada de Marina forman parte de la red de observatorios del Programa de seguimiento del jabalí en Cataluña. En el marco de ese programa se analizan los datos de todas las cacerías organizadas y que registran cazadores voluntarios de 23 cuadrillas de jabalí. Los principales resultados que se obtienen son: presión de caza, participación en las batidas, efectividad, capturas por batida y unidad de superficie, y evolución y estima de la densidad. Ese conjunto de parámetros permiten un seguimiento de las tendencias demográficas en cada espacio. La densidad muestra una tendencia ascendente en el Montnegre i el Corredor y en la Serralada Litoral, igual que en todos los observatorios del norte de Barcelona y Girona. Los datos de la temporada 2014-2015 muestran diferencias entre los tres espacios: 4 jabalíes/km² en la Serralada de Marina, 9 jabalíes/km² en la Serralada Litoral y 10 jabalíes/km² en el Montnegre i el Corredor; diferencias probablemente relacionadas con las diferencias en los hábitats.

Palabras clave

Jabalí, seguimiento poblacional, parques naturales, Diputación de Barcelona

Abstract

Monitoring Wild Boar in el Montnegre i el Corredor in the Serralada Litoral Central

El Montnegre i el Corredor Park, the Serralada Litoral and the Serralada de Marina are part of the network of observatories used by the wild boar monitoring programme in Catalonia. The programme examines the data from all organised hunts and registered by volunteer hunters about 23 groups of wild boar. The main results obtained are: hunting pressure, involvement in drives, effectiveness, catches per drive and area unit, and density evolution and estimates. These parameters make it possible to monitor population trends in each area. The density shows an upward trend in el Montnegre i el Corredor and in the Serralada Litoral in the same way as in all the observatories in northern Barcelona province and Girona province. Data from the 2014-2015 season show differences between the three areas: 4 wild boars per km² in the Serralada de Marina, 9 wild boars per km² in the Serralada Litoral and 10 wild boars per km² in el Montnegre i Corredor. These differences are probably due to differences in the habitats.

Keywords

Wild boar, population monitoring, nature parks, Barcelona Provincial Council