



CATÀLEG DE VERTEBRATS DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL – ANY 2020

CLIENT



**Diputació
Barcelona**

Xarxa de Parcs Naturals

REDACCIÓ

Pere Alzina i Bilbeny
Licenciat en Biologia/Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Consultor ambiental

BASE DE DADES

Joffre López Oller

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	5
2. OBJECTIUS.....	6
3. METODOLOGIA	7
4. RESULTATS I DISCUSSIÓ	11
4.1. Vertebrats	11
4.2. Peixos.....	13
4.3. Amfibis.....	14
4.4. Rèptils.....	16
4.5. Ocells.....	19
4.6. Rates pinyades.....	24
4.7. Mamífers.....	26
5. BIBLIOGRAFIA	29
5.1. Bibliografia destacada	29
5.2. Recursos web.....	29
6. ANNEXOS.....	30
6.1. Peixos.....	30
6.2. Amfibis.....	31
6.3. Rèptils.....	32
6.4. Ocells.....	34
6.5. Rates pinyades.....	46
6.6. Mamífers.....	47

ÍNDIX DE TAULES

Taula 1: Registres dins del Parc	7
--	---

ÍNDIX D'IMATGES

Imatge 1: Categories de la UICN de l'estat de conservació	9
Imatge 2: Aspecte del catàleg “excel” d'amfibis i les seves 2 llistes	10
Imatge 3: La reineta, espècie arborícola	14
Imatge 4: La granota verda és abundant en basses de rec i ornamentals.....	15
Imatge 5: No s'ha comprovat la reproducció de la tortuga mediterrània	16
Imatge 6: El dragó és present en zones habitades.....	17
Imatge 7: L'àliga calçada s'observa en pas migratori	21
Imatge 8: El rupit o pit-roig és una espècie forestal i en expansió	23
Imatge 9: Pipistrel·la comuna.....	25
Imatge 10: La guilla és present arreu del Parc	26
Imatge 11: El cabirol ha colonitzat recentment l'espai	28

ÍNDIX DE GRÀFICS

Gràfic 1: Riquesa d'espècies desglossada per classe taxonòmica.....	11
Gràfic 2: Aportació percentual a la riquesa específica per classe taxonòmica.....	11
Gràfic 3: Riquesa d'espècies per classe taxonòmica	12
Gràfic 4: Percentatge de nidificants segons la seva fenologia.....	19
Gràfic 5: Riquesa d'espècies d'ocells segons la seva fenologia	20

1. INTRODUCCIÓ

El Parc de la Serralada Litoral forma part de la Xarxa d'Espais Naturals protegits, promoguts i gestionats per la Diputació de Barcelona. El Parc està emparat legalment per un Pla especial de protecció del medi físic i el paisatge, aprovat el 2004. Té una extensió de 4.042 hectàrees amb territori de 15 municipis diferents del Maresme i del Vallès Oriental. És, de fet, una secció de la Serralada Litoral que fa de partió entre el Maresme i el Vallès Oriental, entre les rieres i torrents del Maresme i les conques del Mogent-Besòs al cantó vallesà. El sòcol és conformat enterament per roques magmàtiques intrusives, bàsicament granític amb roques filonianes. La vegetació hegemònica són els boscos, les màquies i les brolles mediterrànies (alzinars, boscos de pi pinyer, estepars, màquies de bruc i arboç, etc.) enriquides amb la vegetació de ribera (verneda, pollancreda) que ressegueix els torrents més frescals. Les zones obertes, les pastures i els camps han disminuït amb el pas dels anys i a mesura que hom guanya alçada la seva contribució és percentualment menor. Lògicament, la fauna que hi domina és la característica de les forests mediterrànies (senglar, rata cellarda, picot verd, sargantana cuallarga, etc.) amb alguns elements més característics de les boscanes decídues centreeuropees (cabirol, serp d'Esculapi, pica-soques blau, etc.). La fauna vinculada als camps i a les pastures, a les zones obertes, davalla en paral·lel als canvis de paisatge, d'estructura forestal i composició florística. La vinculada als ecosistemes aquàtics depèn de les basses de rec o ornamentals i, és clar, dels torrents de l'obaga que menen llurs aigües cap al Mogent o al Besòs. El Parc llinda amb la riba esquerra del Mogent al Pla de Ca l'Ametller i al de can Vilaró, motiu pel qual els peixos del Mogent, els ocells aquàtics i de la vegetació helofítica dels marges s'han inclòs en aquest inventari. Les restes humanes més antigues que s'han trobat són del neolític i els monuments megalítics hi són abundants (dolmen de Castellruf, dolmen de Can Gurri, dolmen de Céllecs, menhir de Castellruf, Pedra del Diable, Pedra de les Orenetes, etc.). Actualment, tot l'espai és envoltat per una zona d'alta densitat demogràfica, tant al vessant del Maresme com del Vallès. Per això, la freqüentació humana hi és elevada, sobretot, en caps de setmana i festius, per a realitzar-hi activitats lúdiques (excursionisme, córrer, bicicleta de muntanya, etc.) però també de tradicionals (collir bolets, espàrrecs, etc.). El Parc féu aquest encàrrec a qui signa aquest inventari per actualitzar i harmonitzar el devesall de dades i registres faunístics i, alhora, per incloure o excloure espècies dubtoses per a la comunitat tècnica i científica.

2. OBJECTIUS

A grans trets, l'objectiu del treball és fer una **relació actualitzada dels vertebrats** (peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers) que actualment **viuen** o **s'han observat** (ocells o rates pinyades de pas migratori que no hivernen ni nidifiquen al Parc) al Parc de la Serralada Litoral. El catàleg inclou també les **espècies exòtiques** que s'han establert al Parc, de forma més o menys consolidada. No inclou, en canvi, espècies domèstiques (gat, gos, etc.) que es poden trobar al territori del Parc.

Així doncs, els objectius del Catàleg són:

- **Inventariar** el patrimoni de la fauna vertebrada (peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers) del Parc de la Serralada Litoral.
- Descriure la **distribució** de l'espècie de forma succinta (per exemple: arreu del Parc, només al sector oriental del Parc, només a l'obaga, associat als torrents, etc.).
- Diferenciar la **fenologia de les espècies d'ocells** (residents, estivals reproductors, estivals no reproductors, hivernants o de pas migratori).
- Relacionar cada espècie amb les **figures de protecció legal** segons el marc legislatiu català, espanyol i europeu i de l'**estat de conservació** en funció de les categories de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) sempre i quan existeixin en un marc català (avui per avui només per als peixos, ocells, i rates pinyades).

3. METODOLOGIA

Per a la realització d'aquest **catàleg** no s'ha realitzat treball de camp i tot el treball ha estat, exclusivament, de **gabinet**.

Les **fonts principals d'informació** que han fornit de dades per a la realització d'aquest treball són:

1. **Ornitho.cat**: s'han obtingut els registres de les espècies de vertebrats que s'han entrat en aquesta web durant el període 1981-2020, més concretament només els registres inclosos dins dels límits del Parc. Són un total de 138.426 dades. Els ocells amb el 98,4% de les dades totals són el grup hegemònic. Els peixos i les rates pinyades amb tan sols 14 dades són els dos grups amb menys registres.

Taula 1: Registres dins del Parc

Grup biològic	Nombre de registres
Amfibis	657
Mamífers	905
Ocells	136.228
Peixos	14
Rèptils	608
Rates pinyades	14
TOTAL	138.426

Font: Ornitho.cat

1. **Projecte "Sylvia"**: estacions d'anellament d'esforç constant que estandarditzen la metodologia de captura i anellament d'ocells.
2. **Projecte "Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya" (SOCC)**: transsectes de 3 km on es registren tots els ocells detectats (observats o escoltats) en 6 seccions de 500 metres cadascuna d'elles. Se'n fan 3 dins del Parc.
3. **Prioritat d'ocells per a la conservació a la xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona**: document "excel" elaborat per l'Institut Català d'Ornitologia.
4. **Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya**: web que aplega els registres històrics de flora i fauna a Catalunya i la seva distribució i visualització geogràfica. S'hi refereix al treball com a BDBC. Desglossat en quadrats de 10 x 10 km.
5. **Informació matisada per experts**: contactats personalment per qui signa aquest estudi. Han col·laborat desinteressadament en el catàleg amb l'objectiu de millorar-lo. Són l'Arnau Tolrà i l'Enric Aparicio per als peixos, en Xavier Riera, en Joan Maluquer i Daniel Fernández per als amfibis i rèptils, l'Institut Català d'Ornitologia per als ocells, i, finalment, els serveis tècnics del Parc i de la Diputació de Barcelona.

Adicionalment i per a determinats grups biològics s'han emprat una sèrie d'estudis i documents tècnics, més enllà dels llibres detallats a la bibliografia. A saber:

- Avaluació de l'estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (Boada, M. et al., 2018).
- Seguiment d'indicadors socioecològics en conques fluvials mediterrànies: conca del Besòs (Boada, M. et al., 2019).
- Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral (Campeny, R., 2001).
- Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral-Catàleg (Campeny, R. et al, 2013).
- Anàlisi del Torrent Cuquet com a possible hàbitat per a l'alliberament de tortugues de rierol (CRARC, 2008).
- Bioindicadors de la gestió i l'ús social al Parc de la Serralada Litoral. L'astor, l'àguila marcenca, l'aligot vesper i el duc (Macià, F.X. et al., 2010-16).
- Estudi de la distribució del rossinyol del Japó al Parc de la Serralada Litoral (Alonso, P., 2016-17).
- Anàlisi i modelització espacial de les espècies d'ocells exòtics al Parc Serralada Litoral (Santmartí, R. et al., 2010)
- Inventari i seguiment dels quiròpters del Parc de la Serralada Litoral (Flaquer, C. et al., 2006-2016).
- Avaluació de l'estatus del turó (*Mustela putorius*) al Parc de la Serralada Litoral (García-Rodríguez, S. et al., 2008).
- Distribució dels mamífers del Parc Serralada Litoral (Galanthus, 2001-04).

Quant a la **vàlua legal i conservacionista** l'anàlisi s'ha fet a partir de la **legislació europea, catalana i espanyola** i l'**estatus de conservació** amb les categories de la **UICN** ("Unió Internacional de Conservació de la Natura") per als únics 3 grups biològics (peixos, ocells i rates pinyades) dels quals hi ha informació d'àmbit català. Aquestes disposicions legals i catàlegs d'estats de conservació són:

1. **Directiva 97/62/CE** relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres ("**Directiva Hàbitats**"). Quant a les espècies de fauna els annexos rellevants són l'**Annex II** ("espècies animals i vegetals d'interès comunitari per a la conservació de les quals és necessari designar zones especials de conservació" – ZEC-), l'**Annex IV** ("espècies animals i vegetals d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta") i, en menor grau, l'**Annex V** ("espècies animals i vegetals d'interès comunitari la recol·lecta i explotació de les quals a la natura poden ser objecte de mesures de gestió").
2. **Directiva 2009/147/CE** del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009 relativa a la conservació d'aus silvestres ("**Directiva Aus**"): a l'**Annex I** hi ha la llista d'espècies que "seran objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat amb la finalitat d'assegurar la seva supervivència i la seva reproducció en la seva àrea de distribució".
3. **Real Decreto 139/2011**, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. De la **llista** que estableix es seleccionen només les espècies del **catàleg** que es consideren amenaçades a nivell de l'Estat Espanyol. Aquest catàleg es desglossa en dues categories: "**en perill d'extinció**" ("espècie, subespècie o població d'una espècie la supervivència de la qual és poc probable si els factors causals de la seva situació actual continuen actuant") i "**vulnerable**" ("espècie,

subespècie o població d'una espècie que corre el risc de passar a la categoria anterior en un futur immediat si els factors adversos que actuen sobre ella no són corregits”).

4. **Real Decreto 630/2013**, de 2 de agosto, por el que se regula el “Catálogo español de especies exóticas invasoras”. La llista d'espècies permet determinar quines espècies exòtiques són considerades, legalment, invasores.
5. **Decret Legislatiu 2/2008**, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el **Text refós de la Llei de protecció dels animals**: inclou un sol annex amb les “espècies protegides de la fauna salvatge autòctona”. Les espècies que hi consten són protegides i desglossades **4 categories** (A, B, C i D) en **ordre decreixent de vàlua** conservacionista i, alhora, de la magnitud de sanció que s'hi vincula.
6. **Estatut de conservació segons criteris de la UICN**: les categories són estandarditzades i s'empren les mateixes arreu del món. Els resultats canvien en funció de l'àmbit geogràfic ja que, per exemple, una espècie que sigui molt rara i escassa a Catalunya serà considerada “amenaçada” (categoria que aplega les categories “vulnerable”, “en perill” o “en perill crític”) però si és abundant a Europa allí serà considerada de “preocupació menor”. S'ha utilitzat per als tres únics grups biològics que estaven catalogats per obres sectorials en l'àmbit català: peixos, ocells i rates-pinyades. Les categories utilitzades són les següents (en negreta les tres categories que inclouen les espècies “amenaçades”).
 - Preocupació menor (LC)
 - Pròxima a l'amenaça (NT)
 - **Vulnerable (VU)**
 - **En Perill (EN)**
 - **En perill crític (CR)**
 - Extingida en estat salvatge (EW)
 - Extingida

Imatge 1: Categories de la UICN de l'estat de conservació



Font: © Wikimedia

Amb tota aquesta informació s'han creat **6 catàlegs en format “excel”**: peixos, amfibis, rèptils, ocells, rates pinyades i mamífers. Les rates pinyades tot i ser de la classe taxonòmica dels mamífers s'ha considerat oportú de tractar-les a part, tant per l'important nombre d'espècies com pels buits de coneixement superior que planen damunt d'elles.

Cadascun dels 6 catàlegs “excel” conté **dues llistes d'espècies**:

- Llista d'espècies de presència **segura/altament probable** al Parc: és la principal i la que hauria de servir de referència tècnica. Per a cada espècie s'hi desgrana en columnes els aspectes següents:
 - Codi: numèric i ordinal
 - Nom català
 - Nom científic
 - Nom popular (si es disposa d'ell)
 - Nom castellà
 - Nom anglès
 - Registres “Ornitho”: total de dades obtingudes d'aquesta base de dades que inclou els 6 grups que són objecte d'estudi (per als ocells addicionalment hi ha les dades del projectes “Sylvia” i “SOCC”)
 - Altres fonts: normalment el BDBC però també llibres i informes sectorials
 - Exòtica/Exòtica invasora
 - Estat de Conservació a Catalunya: només per a peixos, ocells i rates pinyades
 - Legislació espanyola
 - Legislació catalana
 - Legislació europea
 - Distribució aproximada: breu descripció de la distribució al Parc (arreu, només en torrenteres, en obagues, etc.)
- Llista d'espècies **antigues i/o de presència dubtosa** al Parc: aquesta llista és un calaix de sastre de mida reduïda i que aplega espècies diverses que hi són incloses per causes diferents. Hi ha espècies que per qui signa aquest treball tenen una presència altament improbable al Parc malgrat que alguns autors/treballs diguin que hi són. També hi ha espècies que només s'han observat una o poques vegades i que, per tant, les seves poblacions són extingides o no pas viables. També hi ha espècies que surten en alguns catàlegs per errors d'identificació. Sigui com sigui, en aquesta llista addicional la informació és menor i només s'hi fa constar el nom català, el nom científic i un comentari breu dels motius que han portat a no incloure l'espècie en la llista de referència o primera de les dues.

Imatge 2: Aspecte del catàleg “excel” d'amfibis i les seves 2 llistes

2	CODI	NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM POPULAR	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	REGISTRES ORNITHO	ALTRES FONTS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	LEGISLACIÓ ESPANYOLA	LEGISLACIÓ CATALANA	LEGISLACIÓ EUROPEA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
3	1	Salamandra comuna	<i>Salamandra salamandra</i>		Salamandra com Common Fire Sala		28				D		A les parts altes i valls humides del Parc on és fre
4	2	Tritó verd	<i>Triturus marmoratus</i>		Tritón jaspeado Marbled Newt		8				D	Annex IV	En dues zones del Parc, al nord i al sud, separades
5	3	Tòtil comú	<i>Alytes obstetricans</i>		Sapo partero coi Common Midwife		202				D	Annex IV	Arreu del Parc, és freqüent.
6	4	Gripau d'esperons	<i>Pelodytes cultripies</i>		Sapo de espuela Western Spadefoot		0	BDBC i Atlas Amfibis i Rèptils			D	Annex IV	Rar i amb poques cites. El 2017 es van alliberar lar
7	5	Granoteta de punts	<i>Pelodytes punctatus</i>	Gripauet	Sapillo moteado Parsley Frog		2				D		Rara, amb poques cites i de localització dispersa,
8	6	Gripau comú	<i>Bufo spinosus</i>		Sapo común Common Toad		270				D		Al centre i nord del Parc, on és escàs
9	7	Gripau corredor	<i>Epidaleia calamita</i>		Sapo corredor Natterjack Toad		10				D	Annex IV	Rar, localitzacions alligades les unes de les altres,
10	8	Reineta meridional	<i>Hyla meridionalis</i>	Granot arbori	Ranita meridior Mediterranean Tr		48				D	Annex IV	Escassa, en tots els sectors del Parc però amb més
11	9	Granota verda ibèrica	<i>Pelophylax perezi</i>	Granot verd	Rana común Perez's Frog		89					Annex V	Al sector central i septentrional del Parc, on és esc
12	10	Granota de Graf	<i>Pelophylax kl. grafi</i>		Rana híbrida de Graf's hybrid frog		0	Butlletí SCH 23: 87-89, 2016					Obaga del Parc (DG51)
13							657						
14													
15		ALTRES ESPÈCIES ANTIGUES/DUBToses											
16	11	Granota pintada	<i>Discoglossus pictus</i>				2 dades al BDBC (UTM: DG 49) a Vilassar de Mar i Premià de Dalt però, aparentment, fora del Parc						
17													
18													


Font: Pere Alzina

4. RESULTATS I DISCUSSIÓ

4.1. Vertebrats

Per al recompte del total de vertebrats del Parc s'han tingut en compte **només les espècies d'ocells nidificants** (residents i estivals reproductores) i, en canvi, s'han descomptat les espècies d'ocells no nidificants (hivernants, de pas o estivals no reproductores). Comptat i debatut, hi ha **165 espècies de vertebrats** que viuen en el Parc, la majoria d'elles durant tot l'any (amfibis, rèptils, ocells residents i mamífers) però algunes només una part de l'any (diverses espècies de rates pinyades i ocells estivals reproductors). El grup més ben representat és el del ocells nidificants (95 espècies), seguit dels mamífers (33 espècies: 11 rates pinyades i 22 mamífers "terrestres"), rèptils (18 espècies), amfibis (10 espècies) i peixos (9 espècies).


Gràfic 1: Riquesa d'espècies desglossada per classe taxonòmica



Font: Pere Alzina

Semblantment, a nivell percentual els ocells nidificants aporten més de la meitat (58%) de les espècies i els mamífers una cinquena part (20%). El 22% restant es distribueix entre els rèptils (11%), amfibis (6%) i peixos (5%).


Gràfic 2: Aportació percentual a la riquesa específica per classe taxonòmica



Font: Pere Alzina

Lògicament, si es tenen en consideració les espècies d'ocells no nidificants (hivernants, estivals no reproductores i de pas) i les espècies antigues i/o dubtoses dels altres grups biològics restants la riquesa específica s'incrementa notablement i, en certa manera, de forma poc acurada o artificiosa. D'aquesta forma, la riquesa **passaria de 165 espècies a 286** o el que és el mateix que s'incrementaria en 121 espècies o, pràcticament, en un 73,3% respecte el valor que es considera més acurat. El grup que modifica més el seu ordre de magnitud de riquesa és, lògicament, el dels ocells (+100 espècies), seguit dels mamífers (+14 espècies) –amb rates pinyades- i rèptils (+5 espècies).

Gràfic 3: Riquesa d'espècies per classe taxonòmica



Font: Pere Alzina

4.2. Peixos

S'han inventariat a través de diverses fonts d'informació **9 espècies de peixos** al Parc, entre les quals **4 espècies autòctones** i **5 d'exòtiques**. Les espècies s'han detectat en basses de rec o ornamentals i, sobretot, al riu Mogent. No es descarta que alguna espècie que es trobi al Mogent pugui ser present temporalment en els trams baixos d'alguns dels torrents tributaris en èpoques de cabal elevat.

Les 4 espècies autòctones són el **barb de muntanya** (*Barbus meridionalis*), la **bagra** (*Squalius laietanus*), el **llopet de riu** (*Cobitis paludica*) i l'**anguila** (*Anguilla anguilla*). Les dues primeres tenen, a Catalunya, una categoria "Vulnerable" (VU), la tercera "En Perill Crític" (CR) i la quarta i darrera, l'anguila, es considera "En Perill" (EN). El barb de muntanya gaudeix del grau màxim de protecció europea (Annex II). El llopet de riu (*Cobitis paludica*), el que gaudeix d'un pitjor estat de conservació a Catalunya (CR) i, a més, és l'única espècie que està protegida per la legislació catalana (categoria D).

Les 5 espècies exòtiques són el carpi daurat (*Carassius auratus*), la carpa (*Cyprinus carpio*), el veró/veró de Llenguadoc (*Phoxinus sp.*), el gardí (*Scardinius erythrophthalmus*) i la gambúsia (*Gambusia holbrooki*). D'aquestes n'hi ha **2** que són **invasores**: la carpa (*Cyprinus carpio*) i la gambúsia (*Gambusia holbrooki*). Hi ha, per tant, menys espècies exòtiques invasores (2) que no invasores (3).

És plausible que es puguin trobar noves espècies de peixos en prospeccions més intenses al Mogent, en moments de cabals elevats als torrents afluent -per l'entrada puntual de peixos del Mogent a les parts baixes dels torrents- o en basses de rec i/o ornamentals on s'hi hagin produït alliberaments deliberats d'exemplars, normalment exòtics.

Seria també interessant fer un treball de camp als torrents que porten aigua durant més temps (torrent d'en Cuquet, riera de Vallromanes, etc.), tots ells tributaris del Mogent.

Quant al grup *Phoxinus sp.* –exòtic- cal dir que fins fa poc es considerava que contenia una sola espècie de distribució europea general que era el *Phoxinus phoxinus*. Tanmateix, estudis recents han posat de manifest que certes poblacions amb diferències morfològiques i genètiques haurien de ser separades en espècies diferents. Més concretament, a la Península Ibèrica s'hi trobaria el *Phoxinus bigerri*, el *Phoxinus septimaniae* i, probablement, el *Phoxinus phoxinus*. La diferenciació específica és extremadament complexa i, consegüentment, en aquest catàleg s'han tractat de forma unitària com a *Phoxinus sp.* En el cas del Besòs, estudis recents semblen demostrar que dues espècies coexisteixen a la conca, sense detallar en quins afluent: *Phoxinus septimaniae* i una altra, per descriure, referenciada com a *Phoxinus sp.*

No hi ha dades que el peix sol (*Lepomis gibbosus*) es trobi al Mogent però sí al Congost. És per això que l'espècie s'ha posat a la llista d'espècies antigues/dubtoses perquè és plausible que es pugui trobar algun exemplar al Mogent en un futur no llunyà.

4.3. Amfibis

S'han inventariat **10 espècies d'amfibis** al Parc, totes elles autòctones i una més que les que constaven en catàlegs anteriors (2011 i 2013, Minuartia Estudis Ambientals). D'aquestes espècies destaca la recent **troballa** (Fernàndez, D., Maluquer, J. & Miras, M., 2016) d'una nova espècie, la **granota de Graf** (*Pelophylax kl. grafi*) a La Roca del Vallès. Cal comentar el cas del **gripau d'esperons** (*Pelobates cultripes*) perquè només hi ha cites antigues i es considera extingit en tant que espècie reproductora. Ara bé, a partir del 2017 s'inicià un projecte de reintroducció de l'espècie al Parc en una finca del municipi de Cabrera de Mar). S'han alliberat 1300 capgrossos metamòrfics el 2019 i vora els 3000 aquest 2020. Es creu que a la primavera del 2021 ja es reproduirà en aquest entorn. Avui per avui, doncs, l'espècie és present al Parc però encara no s'hi reproduceix. En menor grau, també convé esmentar la **granoteta de punts** (*Pelodytes punctatus*) que és rara, amb poques cites i de localització dispersa, sud i nord del Parc, sovint als límits d'aquest.

Del total de 10 espècies n'hi ha **8** que són **protegides** per la legislació catalana i incloses en la **categoria D**, mentre que la granota verda ibèrica i la granota de Graf no estan pas protegides. A nivell de legislació europea cal significar que no hi ha cap espècie inclosa en l'Annex II però sí que n'hi ha **5** que d'incloses en l'**Annex IV**. Aquestes són:

- Tritó verd (*Triturus marmoratus*)
- Tòtil comú (*Alytes obstetricans*)
- Gripau d'esperons (*Pelobates cultripes*)
- Gripau corredor (*Epidalea calamita*)
- Reineta meridional (*Hyla meridionalis*)

Imatge 3: La reineta, espècie arborícola



Font: Enric Badosa

A més, a la llista d'**espècies antigues/dubtoses** hi ha la granota pintada (*Discoglossus pictus*) car hi ha 2 dades al BDBC (UTM: DG 49) a Vilassar de Mar i Premià de Dalt però, aparentment, fora del Parc. Està en expansió i no seria gens sorprenent que en un termini

proper es trobessin més exemplars. És una espècie inclosa a l'Annex IV de la Directiva Hàbitats i que no és protegida per la legislació catalana pel seu caràcter exòtic. Una possible interacció negativa de la granota pintada amb les altres espècies autòctones d'amfibis és la seva capacitat de ser portadora asimptomàtica de malalties emergents d'amfibis.

Imatge 4: La granota verda és abundant en basses de rec i ornamentals



Font: Júlia Ferrer

4.4. Rèptils

S'han inventariat **18 espècies de rèptils** al Parc. D'aquestes n'hi ha **17 d'autòctones** i **1 d'exòtica i invasora** (tortuga d'aigua americana o de Florida).

De les **17 espècies autòctones** destaquen les 2 tortugues, una de terrestre i una d'aigua dolça: la **tortuga mediterrània** (*Testudo hermanni*) i la **tortuga de rierol** (*Mauremys leprosa*). Ambdues espècies són incloses en el grau màxim de protecció europeu, en l'**Annex II** (i en l'Annex IV). De la primera no se n'ha provat les poblacions viables i es creu que la majoria d'exemplars són assilvestrats o amb elevada probabilitat de ser-ho. De la segona sí, es troba al Mogent, on es troben la majoria d'exemplars però també s'han trobat exemplars aïllats en altres llocs (basses de rec del Maresme i el Vallès Oriental).

Hi ha 2 altres espècies incloses en l'**Annex IV** europeu: la **serp de ferradura** (*Hemorrhois hippocrepis*) i la **serp d'Esculapi** (*Zamenis longissimus*) amb requeriment d'hàbitats oposats (prats sabanoides assolellats per a la primera espècie i zones forestals humides per a la segona). De la serp de ferradura hi ha sols dues cites recollides i validades ("Amfibis i Rèptils del Parc Serralada Litoral", Minuartia, 2013) mentre que de la segona tan sols hi ha una cita a l'Ornitho però diverses al BDBC (Céllecs i Sant Mateu entre les localitzacions segures). Espècie en clara expansió des del Montnegre cap al sud. En el conjunt de les 18 espècies inventariades, serp de ferradura a banda, n'hi ha una altra que no té dades recollides a Ornitho però que, això no obstant, s'ha inclòs en el catàleg. Es tracta de l'**escurçó pirinenc** (*Vipera aspis*). Hi ha dues dades al BDBC a la UTM DG40: una fora del Parc (can Congostell) però l'altra de localització indeterminada. El catàleg "Amfibis i Rèptils del Parc Serralada Litoral" (Minuartia, 2013) en recull una altra al límit meridional del Parc. És una espècie que fa anys tenia seu límit meridional al Montnegre però des de fa algunes desenes d'anys també ha colonitzat el sector del Corredor i es va estenent cap al sud. És probable que el nombre de cites s'incrementi amb més prospeccions. El **llangardaix ocel·lat** (*Timon lepidus*) és una altra espècie interessant a nivell legal (categoria C a la legislació catalana), més abundant als vessants litorals del Parc però amb una tendència regressiva general.

Imatge 5: No s'ha comprovat la reproducció de la tortuga mediterrània



Font: Pere Alzina

L'única espècie **exòtica** també és **invasora** i es tracta de la **tortuga d'aigua americana** o de Florida (*Trachemys scripta*).

Imatge 6: El dragó és present en zones habitades



Font: Pere Alzina

La llista d'**espècies antigues/dubtoses** inclou **5 espècies** per diferents motivacions que tot seguit es comenten:

- Tortuga mora (*Testudo graeca*): presència recollida per un estudi específic (Minuartia, 2013) on en tant que espècie al·lòctona no s'hi fan constar ni el total de cites ni sengles localitzacions. No consta, però, cap dada al BDBC tot i que n'hi ha una de pròxima a l'àmbit d'estudi però dins de la ciutat de Barcelona i, per tant, d'un exemplar escapat. És una espècie molt termòfila i que viu a prop del mar (excepte al Vallès Oriental, Vallès Occidental i Bages) i sempre per sota dels 150 metres d'alçada.
- Lladrió llistat (*Chalcides striatus*): Hi ha 2 dades al BDBC a la UTM DG40 de localització i data no precises. No és recollit ni a l'"Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya i Andorra" (1995) ni a d'altres estudis específics (Minuartia, 2013). Si existís al Parc seria en zones de gramínies i, per tant, de forma molt localitzada i escassa. Caldria fer-ne una prospecció intensiva en zones òptimes per a aquesta espècie.
- Sargantana roquera (*Podarcis muralis*): Hi ha 1 dada a Ornitho. A més, hi ha 1 dada pròxima al Parc (UTM DF39, Santa Coloma de Gramenet) recollida pel BDBC. Tanmateix, no és recollida ni a l'"Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya i Andorra" (1995) ni a altres estudis específics (Minuartia, 2013). La dada d'Ornitho podria tractar-se d'un error en la identificació ja que la població més propera és prou lluny de l'àmbit.
- Escurçó ibèric (*Vipera latastei*): Hi ha 1 dada a Vallromanes del 1980 (Rivera & Sáez, 2003) considerada vàlida però molt antiga. A més, hi ha 1 dada pròxima al Parc (UTM DF39, Santa Coloma de Gramenet) recollida pel BDBC. Tanmateix, probablement cal considerar-lo extingit al Parc. Caldria un treball de prospecció intensa i específica en els hàbitats més favorables a l'espècie per acabar de dirimir la seva presència actual.

- Pitó reial (*Phyton regius*): presència recollida per un estudi específic (Minuartia, 2013) on en tant que espècie al·lòctona no s'hi fa constar ni el nombre de cites ni sengles localitzacions. Espècie de l'Àfrica tropical que no s'ha establert pas a l'àmbit.

D'aquestes **5 espècies dubtoses** hom creu que **només 1 o 2 podrien arribar a trobar-se en algun punt del Parc**, de forma localitzada i escassa. Aquestes espècies són l'escurçó ibèric (*Vipera latastei*) i, potser, el lludrió llistat (*Chalcides striatus*). Seria convenient fer una prospecció intensiva en zones potencialment òptimes per a descartar-les o incloure-les definitivament a la llista de rèptils. Les 3 espècies restants es considera que, avui per avui, són inexistents o amb individus que no formen pas poblacions reproductores.

4.5. Ocells

S'han registrat un total de **195 espècies** d'ocells, **181 espècies autòctones** i **14 espècies exòtiques**.

De les 14 **espècies exòtiques**, la meitat (7 espècies) són **invasores**:


- Oca d'Egipte (*Alopochen aegyptiaca*)
- Cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*)
- Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)
- Múnia roig (*Amandava amandava*)
- Bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*).
- Bec de corall cuanegre (*Estrilda troglodytes*)
- Rossinyol del Japó (*Leiothrix lutea*)

Convé esmentar aquí la recent colonització (Alonso, P., 2017) de l'espai per part del **rossinyol del Japó** (*Leiothrix lutea*), més abundant i estès en període hivernal que en període estival de nidificació. Això no obstant, són diverses desenes de registres en ple període reproductor.

De la resta d'espècies exòtiques que no són invasores, el **faisà** (*Phasianus colchicus*), és, probablement, l'única espècie que s'ha establert com a nidificant i, per tant, que compta amb una població viable i consolidada.

Es calcula que hi ha unes **95 espècies nidificants al Parc**, de les quals n'hi ha **62 de residents** i **33 d'estivals reproductores**. Les espècies nidificants són les que confereixen **més valor al territori** per tal com revelen una qualitat òptima d'hàbitat (tranquil·litat per a fer el niu, abundància de menjar per a l'alimentació dels pollets, etc.) per a la parella adulta i per a la seva descendència que, a vegades, consta de postes diferents. És plausible que alguna de les espècies inventariades ara no hi facin niu o facin niu a prop del Parc però fora dels seus límits. Semblantment, és probable també que algunes de les espècies que no s'han considerat nidificants puguin actualment fer niu localment i de forma escassa en algun punt del Parc.

Gràfic 4: Percentatge de nidificants segons la seva fenologia



Font: Pere Alzina


Hi ha **4 espècies** posades en la categoria d'**estivals no reproductores** que són l'oreneta cuablanca (*Delichon urbica*), l'oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*), el falciot negre (*Apus apus*) i el ballester (*Apus melba*). Es tracta d'espècies que bàsicament fan els nius en edificis dels nuclis habitats del perímetre del Parc amb l'excepció de l'oreneta cua-rogenca que el sol fer en viaductes, ponts, tubs i canalitzacions de mida diversa.

Hi ha **32 espècies** categoritzades com a **hivernants** com la becada (*Scolopax rusticola*), el tord ala-roig (*Turdus iliacus*), la griva cerdana (*Turdus pilaris*), el pinsà mec (*Fringilla montifringilla*), el pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*), el lluer (*Carduelis spinus*), el pardal de bardissa (*Prunella modularis*), el cercavores (*Prunella collaris*), el reietó (*Regulus regulus*) o el pela-roques (*Tichodroma muraria*).

Hi ha **64 espècies de pas**, algunes d'elles tan sols sobrevolen l'espai aeri del Parc i no s'hi aturen pas. Són, pràcticament, un terç del total. Aquest nombre podria créixer notablement si hi hagués una prospecció intensiva del tram del Mogent que llinda amb el Parc. Aquest sector aplega un reguitzell d'espècies que s'hi arreceren a l'hivern i que no es troben als boscos, brolles i camps del Parc. Ara bé, és sobretot en els passos migratoris quan el riu esdevé un hàbitat molt adequat per a moltes espècies del centre i nord d'Europa i que, durant unes hores o uns pocs dies, s'aturen al riu a descansar i alimentar-se abans de reprendre la llarga migració nord enllà. Per tant, la prospecció intensiva dels ocells a l'hivern i en els passos migratoris en aquest tram fluvial ran del Parc, hi faria créixer, molt probablement, el nombre d'espècies de pas i/o hivernants.

Entre aquestes espècies migratòries hi ha la cigonya (*Ciconia ciconia*), la grua (*Grus grus*), el falcó de la reina (*Falco eleonore*), l'arpella (*Circus aeruginosus*), el milà negre (*Milvus migrans*), el milà reial (*Milvus milvus*), l'àliga pescadora (*Pandion haliaetus*), el mastegatxex (*Ficedula hypoleuca*), el bitxac rogenç (*Saxicola rubetra*) o el mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*).

Gràfic 5: Riquesa d'espècies d'ocells segons la seva fenologia



Font: Pere Alzina

De totes les espècies nidificants és el **botxí meridional** (*Lanius meridionalis*) el que té un estat de conservació a Catalunya més precari: **espècie en perill** (EN). Hi ha altres espècies amb un estatus de conservació **vulnerable** (VU) com l'aligot vesper (*Pernis apivorus*), el xot (*Otus scops*), l'òliba (*Tyto alba*), el picot garser petit (*Dendrocopos minor*), el mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*), el bitxac comú (*Saxicola torquata*), la cadernera (*Carduelis carduelis*), el verdum (*Carduelis chloris*), el passerell (*Carduelis cannabina*) o la cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*).

Imatge 7: L'àliga calçada s'observa en pas migratori



Font: Júlia Ferrer

Hi ha **11 espècies** nidificants incloses en l'**Annex I** de la Directiva Aus. Hi ha rapinyaires (astor, duc, etc.) però també n'hi ha d'altres que no (enganyapastors, tallareta cuallarga, hortolà, etc.). Aquestes espècies són:

- Astor (*Accipiter gentilis*)
- Àguila marcenca (*Circaetus gallicus*)
- Aligot vesper (*Pernis apivorus*)
- Duc (*Bubo bubo*)
- Corriol petit (*Charadrius dubius*)
- Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

- Cotolet (Lullula arborea)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
- Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
- Hortolà (Emberiza hortolana)

Cal significar que hi ha un **nombre rellevant d'espècies** (un mínim de 15 espècies, 7 considerades nidificants i 8 considerades no nidificants) que **mereixerien un tractament de dades més acurat i afinat** del que permet l'abast d'aquest treball. D'aquesta forma es milloraria el coneixement de la seva distribució al Parc i, sobretot, se'n verificaria la seva categoria fenològica. Això permetria saber per a totes i cadascuna de les seves observacions no només la localització i la data exacta sinó l'índex de reproducció (observat en hàbitat adequat, cantant, peixant pollets, etc.).

D'entre les incloses a la llista dels **nidificants** destaquen aquestes espècies:

- Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*): 1 dada en període reproductor. Nidificant a la vall del Mogent.
- Rascló (*Rallus aquaticus*): ha criat al Mogent però no de forma regular i sempre en nombre escàs.
- Corriol petit (*Charadrius dubius*): nidifica al Mogent de forma irregular.
- Teixidor (*Remiz pendulinus*): s'ha observat a la riba del Mogent en període nidificant. Hi ha 1 registre en època reproductora.
- Cuereta groga (*Motacilla flava*): ha criat a la plana al·luvial del Mogent entre la Roca i Montornès.
- Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*): va criar a la pedrera de Santa Maria de Martorelles (1985). Hi ha 4 registres en període reproductor.
- Trencapinyes (*Loxia curvirostra*): havia criat en una plantació de pi roig fora del Parc però a prop (Urbanització Mas Llobart de Sant Fost de Campsentelles). Hi ha 3 registres en període reproductor dins del Parc.

De les espècies incloses com a **no nidificants** se'n destacarien les següents:

- Àguila calçada (*Aquila pennata*): hi ha 3 registres en època reproductora estricta.
- Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*): hi ha 12 registres en època reproductora estricta.
- Gaig blau (*Coracias garrulus*): hi ha 1 registre en època reproductora estricta.
- Cogullada (*Galerida cristata*): havia criat en zones agrícoles com les vinyes de Santa Maria de Martorelles. Tan sols 1 registre en època reproductora estricta.
- Pardal roquer (*Petronia petronia*): hi ha 1 registre en època reproductora estricta.
- Pardal de bardissa (*Prunella modularis*): hi ha 9 registres en època reproductora estricta.
- Tallareta vulgar (*Sylvia communis*): hi ha 3 registres en època reproductora estricta.
- Cornella negra (*Corvus corone*): hi ha 2 registres en època reproductora estricta.

Imatge 8: El rupit o pit-roig és una espècie forestal i en expansió



Font: Júlia Ferrer

Hi ha altres espècies que tot i ser de nidificació segura (àliga marcenca, aligot vesper, astor, duc, etc.) convindria disposar de cartografia associada i/o d'afinar la seva distribució i abundància. Això permetria també implementar les mesures preventives per a la protecció dels seus nius.

Per a totes les espècies amb una fenologia incerta i poc clara (colltort, cotoliu, cogullada vulgar, cuereta torrentera, cotxa cua-roja, durbec, passerell, trencapinyes, estornell negre, cruixidell, hortolà, etc.) s'han destriat les dades del període reproductor estricte (15 de juny-15 d'agost) per saber si eren potencialment nidificants a la zona. En alguns casos s'ha considerat que sí que hi fan niu (cotoliu, durbec, passerell, trencapinyes, hortolà, etc.) però en d'altres no (àguila calçada, gaig blau, cogullada, pardal de bardissa, cornella negra, etc.). El criteri emprat per acceptar o rebutjar l'espècie com a nidificant s'ha basat en la informació proveïda pels dos atles comarcals d'ocells nidificants afinada amb el coneixement tècnic i del territori de qui signa aquest treball.

4.6. Rates pinyades

S'han inventariat **15 espècies de rates pinyades** al Parc, totes elles autòctones i, per tant, cap d'elles exòtica ni exòtica invasora. La majoria són espècies rares, citades poques vegades i algunes amb citacions antigues. Només hi ha una espècie molt comuna, la pipistrel·la de vores clares (*Pipistrellus kuhlii*).

Totes elles estan protegides per la legislació europea, espanyola i catalana. A nivell legal destaquen les **5 espècies** incloses en el grau màxim de protecció (**Annex II**) de la **normativa europea**:

- Ratpenat de ferradura petit (*Rhinolophus hipposideros*)
- Ratpenat de ferradura mediterrani (*Rhinolophus euryale*)
- Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*)
- Ratpenat rater mitjà (*Myotis blythii*)
- Ratpenat de cova (*Miniopterus schreibersi*)

També destaquen les **4 espècies** que s'hagin categoritzat com a “**Vulnerable**” per la **legislació espanyola**:

- Ratpenat de ferradura mediterrani (*Rhinolophus euryale*)
- Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*)
- Ratpenat rater mitjà (*Myotis blythii*)
- Ratpenat de cova (*Miniopterus schreibersi*)

Quant al seu **estat de conservació a Catalunya**, n'hi ha **4** amb categoria de “**Vulnerable**” (VU):

- Ratpenat de ferradura mediterrani (*Rhinolophus euryale*)
- Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*)
- Ratpenat rater mitjà (*Myotis blythii*)
- Ratpenat de cova (*Miniopterus schreibersi*)

La llista d'**espècies antigues/dubtoses** la conformen 2 espècies pels motius que es detallen a continuació:

- Ratpenat de ferradura gros (*Rhinolophus ferrumequinum*): no hi ha cap registre al BDBC, ni a Ornitho ni al llibre “Ratpenats Ciència i Mite” (Serra-Cobo, J. et al., 2008) però és dins l'àrea potencial de distribució segons el llibre “Els Ratpenats” (Flaquer, C. & Puig, X., 2012). Els hàbitats del Parc (pinedes, brolles, alzinars, etc.) s'ajusten als seus requeriments ecològics.
- Ratpenat rater gros (*Myotis myotis*): hi ha 4 registres al BDBC a la UTM DF39 que inclou una petita porció del Parc. No hi ha, però, la localització precisa per saber si les dades són a dins o a fora del Parc. La resta de fonts d'informació no l'inventarien en el territori comprès pels límits del Parc i per això no és a la llista principal sinó a la complementària.

Les rates pinyades són el grup de mamífers i de vertebrats terrestres més desconeguts. La intensificació del treball de camp ha comportat l'aparició de "noves" espècies que no havien estat inventariades a Catalunya ni a l'àmbit precís d'estudi. La seva biologia també és poc coneguda. És possible que en el futur apareguin noves espècies o nous refugis actualment desconeguts.

Imatge 9: Pipistrel·la comuna



Font: Pere Alzina

4.7. Mamífers

S'han inventariat **22 espècies de mamífers** al Parc. D'aquestes n'hi ha **18 d'autòctones** i **4 d'exòtiques**.

De les **18 espècies autòctones** destaca l'**eriçó clar** (*Atelerix algirus*) –menys abundant i més termòfil que l'eriçó fosc-, la **rata cellarda** (*Eliomys quercinus*) o el **cabirol** (*Capreolus capreolus*) –detectat per primer cop l'any 2000, en expansió del Montnegre cap al sud de la serralada-.

Cal significar que hi ha 4 espècies protegides per la legislació catalana, totes elles en el grau menor o **categoria D**:

- Eriçó fosc (*Erinaceus europaeus*)
- Eriçó clar (*Atelerix algirus*)
- Esquirol (*Sciurus vulgaris*)
- Mostela (*Mustela nivalis*)

A més, l'**eriçó clar** (*Atelerix algirus*) forma part de l'**Annex IV** de la legislació europea i el **gat mesquer** (*Genetta genetta*) és a l'**Annex V** –regulació de la seva captura- de la legislació europea. La gran majoria d'espècies de mamífers (18 espècies del total de 22), doncs, no són pas espècies protegides per la legislació.

Imatge 10: La guilla és present arreu del Parc



Font: Júlia Ferrer

De les **4 espècies exòtiques** només el **visó americà** (*Neovison vison*) és catalogada com a **exòtica invasora**. S'ha considerat que la rata negra (*Rattus rattus*), la rata comuna (*Rattus norvegicus*) i el gat mesquer (*Genetta genetta*) són espècies exòtiques malgrat que faci segles que són al territori, més en el cas del gat mesquer i menys en la rata comuna.

Val a dir que no hi consens tècnic per dirimir quants anys ha de viure una espècie en un lloc determinat per deixar de considerar-la al·lòctona/exòtica. Els ratolins domèstics (*Mus musculus*) no són autòctons però fa més de 1.000 anys que són aquí. A l'altra banda hi ha el visó americà (*Neovison vison*) que fa poques dècades que és aquí. Al bell mig espècies com

la rata comuna (*Rattus norvegicus*) que fa uns tres segles que és aquí. Sí que hi ha, però, base legal per a ser considerada invasora o no.

La llista d'**espècies antigues/dubtoses** inclou **8 espècies** que es detallen a continuació, a més del motiu pel qual han estat segregades de la llista principal:

- Rata d'aigua (*Arvicola sapidus*): hi ha 8 registres al BDBC. Es considera, però, extingida en l'àmbit del Mogent i torrents tributaris.
- Coipú (*Myocastor coipus*): hi ha 1 registre al BDBC, al pla de can Font, a ponent del Mogent i fora de Parc. Tanmateix, com que el Parc arriba a la riba esquerra del Mogent al Pla de Can Vilaró és probable que l'espècie s'expandeixi pel Mogent i cada cop sigui més habitual, tal com està passant a moltes zones del nord-est de Catalunya.
- Llebre europea (*Lepus europaeus*): hi ha 4 registres al BDBC dels quals no es coneix ni la data ni la localització amb exactitud. És possible que hi sigui però no consten dades actuals d'aquesta espècie. A la "Distribució dels Mamífers del Parc Serralada Litoral" (Galanthus, 2001-2004) es notifica que se n'alliberaren a la Roca del Vallès amb objectius cinegètics el 2001.
- Turó (*Mustela putorius*): hi ha 7 registres al BDBC en 3 UTM que inclouen territori del Parc (Céllecs, Sant Mateu, etc.) però s'ignora les dates i les localitzacions precises - dins o fora del Parc- de totes elles. El turó, però, no és recollit en l'estudi "Distribució dels Mamífers del Parc Serralada Litoral" (Galanthus, 2001-2004). En un mateix sentit, el llibre "Els grans mamífers de Catalunya i Andorra" (Ruiz-Olmo, J. & Aguilar, À., 1995) considera que l'espècie era present a l'àmbit fins al 1986, no pas després. El 2008 es féu una prospecció intensiva ("Avaluació de l'estatus del turó –*Mustela putorius*- al Parc de la Serralada Litoral", Galanthus, 2008) en els hàbitats apropiats (torrents de l'obaga) i no es va detectar cap indicatiu de presència amb cap mètode de detecció.
- Llúdriga (*Lutra lutra*): tot i que no hi hagi cap registre a l'àmbit del Parc és present al riu Congost però utilitza el Mogent com a àrea de dispersió fora d'època de cria i, per tant, hi té una presència irregular, estacional i fluctuant al llarg dels anys.
- Gat fer (*Felis silvestris*): hi ha 1 registre a Ornitho el 26 de gener del 2020 en el terme municipal d'Argentona. A més, hi ha 4 registres al BDBC a la UTM DF39 que inclou una petita part del Parc però no es detallen les localitzacions precises. El llibre "Els grans mamífers de Catalunya i Andorra" (Ruiz-Olmo, J. & Aguilar, À., 1995) no la considera pas en l'àmbit ni a les rodalies. Si la dada d'Ornitho fos correcta caldria una prospecció intensiva per determinar la presència d'aquesta espècie al Parc que es troba en expansió a Catalunya. Es considera plausible que aparegui en un futur no llunyà.
- Llop (*Canis lupus*): hi ha 4 registres al BDBC (1 a la UTM DF49 i 3 a la DF3) de les quals s'ignoren les dates i localitzacions precises. S'ha observat algun llop solitari a poques desenes de quilòmetres però a la Serralada Prelitoral, de la qual l'àmbit se'n separa per una zona amb alta densitat d'infraestructures viàries.
- Daina (*Dama dama*): hi ha 1 registre a Ornitho el 14 de juliol de 2015 en terme municipal de Llinars del Vallès. Segurament es podria tractar d'una confusió amb el cabirol però si la dada fos correcta probablement seria d'algun exemplar escapat d'alguna finca en semi-captivitat i incapaç d'establir una població viable. En Jordi

Ruiz esmenta que als anys 60 del segle XX se'n van alliberar al cantó vallesà del Montnegre amb finalitat cinegètica.

Imatge 11: El cabirol ha colonitzat recentment l'espai



Font: Pere Alzina

5. BIBLIOGRAFIA

5.1. Bibliografia destacada

Peixos continentals de Catalunya: ecologia, conservació i guia d'identificació (Aparicio, E., Lynx Edicions 2016).

Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears (Rivera, X. et al., Lynx Edicions, 2011).

Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe (Speybroek, J. et al. Bloomsbury Natural History, 2016),

Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya i Andorra (Llorente, G.A et al., Edicions El Brau, 1995).

Atles dels ocells nidificants del Maresme (Andino, H. et al, Barcelona 2005).

Els ocells del Vallès Oriental (Ribas, J. Lynx Edicions, 2000)

Els ratpenats de Catalunya (Flaquer, C. & Puig, X. Brau Edicions, 2012).

Ratpenats: ciència i mite (Serra-Cobo, J. et al., Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008).

Insectívors i Rosegadors de Catalunya: metodologia d'estudi i catàleg faunístic (Gosàlbez, J., Ketres Editora, 1987).

Els Grans Mamífers de Catalunya i Andorra (Ruiz-Olmo, J. & Aguilar, À., Lynx Edicions, 1995).

5.2. Recursos web

Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya: www.biodiver.bio.ub.es/biocat

Ornitho.cat: www.ornitho.cat

Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya: www.sioc.cat

The IUCN Redlist of Threatened Species: www.iucnredlist.org/

Descobreix els ratpenats: www.ratpenats.org

6. ANNEXOS

6.1. Peixos

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Barb de muntanya	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo de montaña	Mediterranean Barbel		Riu Mogent.
Carpí daurat	<i>Carassius auratus</i>	Pez dorado, pez rojo	Goldfish, Golden Carp	Exòtica	Riu Mogent i basses de rec i ornamentals.
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	Carp	Exòtica invasora	Riu Mogent.
Veró/Veró de Llenguadoc	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Piscardo, Piscardo de Languedoc	Adour Minnow, Languedoc Minnow	Exòtica	Riu Mogent. Hi domina en la població ictiològica.
Gardí	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Gardí	Common Rudd	Exòtica	Riu Mogent.
Bagra	<i>Squalius laietanus</i>	Bagre	Ebro Chub		Riu Mogent.
Llopet de riu	<i>Cobitis paludica</i>	Colmilleja	Southern Iberian Spined-loach		Riu Mogent.
Gambúsia	<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia	Eastern Mosquitofish	Exòtica invasora	Riu Mogent i basses de rec i ornamentals.
Anguila	<i>Anguilla Anguilla</i>	Anguila	Eel		Riu Mogent.

6.2. Amfibis

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Salamandra comuna	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra común	Common Fire Salamander		A les parts altes i valls humides del Parc on és freqüent.
Tritó verd	<i>Triturus marmoratus</i>	Tritón jaspeado	Marbled Newt		En dues zones del Parc, al nord i al sud, separades entre elles.
Tòtil comú	<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo partero común	Common Midwife Toad		Arreu del Parc, és freqüent.
Gripau d'esperons	<i>Pelobates cultripies</i>	Sapo de espuelas	Western Spadefoot		Extingit com a espècie reproductora. Ara bé, des del 2017 que s'han alliberat larves i exemplars metamorfitzats a una bassa al municipi de Cabrera de Mar. Van ser 1300 capgrossos metamòrfics el 2019 i vora els 3000 aquest 2020. Es creu que a la primavera del 2021 ja es reproduirà en aquest entorn.
Granoteta de punts	<i>Pelodytes punctatus</i>	Sapillo moteado común	Parsley Frog		Rara, amb poques cites i de localització dispersa, sud i nord del Parc, sovint als límits d'aquest.
Gripau comú	<i>Bufo spinosus</i>	Sapo común	Common Toad		Al centre i nord del Parc, on és escàs
Gripau corredor	<i>Epidalea calamita</i>	Sapo corredor	Natterjack Toad		Rar, localitzacions aïllades les unes de les altres, però en tots els sectors del Parc.
Reineta meridional	<i>Hyla meridionalis</i>	Ranita meridional	Mediterranean Tree Frog		Escassa, en tots els sectors del Parc però amb més cites al vessant meridional probablement per dèficit de prospecció a la cara nord.
Granota verda ibèrica	<i>Pelophylax perezi</i>	Rana común	Perez's Frog		Al sector central i septentrional del Parc, on és escassa.
Granota de Graf	<i>Pelophylax kl. grafi</i>	Rana híbrida de Graf	Graf's hybrid frog		Obaga del Parc (DG51)

6.3. Rèptils

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Tortuga mediterrània	<i>Testudo hermanni</i>	Tortuga mediterránea	Herman's Tortoise		Zones arbustives. Els exemplars són assilvestrats o amb elevada probabilitat de ser-ho. Rara.
Tortuga de rierol	<i>Mauremys leprosa</i>	Galápago leproso	Spanish Pond Turtle		Al Mogent, on es troben la majoria d'exemplars. També s'han trobat exemplars aïllats en altres llocs (basses de rec al Maresme i el Vallès Oriental). Rara.
Tortuga d'aigua americana	<i>Trachemys scripta</i>	Tortuga de Florida	Pond slider	Exòtica invasora	En basses de rec i ornamentals. Rara.
Dragó rosat	<i>Hemidactylus turcicus</i>	Salamanquesa rosada	Mediterranean House Gecko		Als vessants litorals del Parc, lligat a zones humanitzades i construccions aïllades. Rar.
Dragó comú	<i>Tarentola mauritanica</i>	Salamanquesa común	Moorish Gecko		Masos i cases del Parc, més freqüent als vessants litorals. Freqüent.
Vidriol europeu	<i>Anguis fragilis</i>	Lución	Common Slowworm		Sots humits del Parc amb vegetació de ribera. També a prop de les basses artificials. Hàbitats més òptims al vessant vallesà. Rar.
Sargantana cuallarga	<i>Psammmodromus algirus</i>	Lagartija colilarga	Large Psammmodromus		A bona part del Parc però més abundant als vessants litorals. Freqüent.
Sargantana cendrosa	<i>Psammmodromus edwardsianus</i>	Lagartija cenicienta	East Iberian Psammmodromus		Marges de bosc i brolles esclarissades i zones de baixa coberta vegetal. Prefereix els vessants litorals del sud del Parc. Rara.
Llangardaix ocel·lat	<i>Timon lepidus</i>	Lagarto ocelado	Ocellated lizard		A bona part del Parc però més abundant al vessant litoral. Escàs.
Sargantana ibero provençal	<i>Podarcis liolepis</i>	Lagartija ibérica	Columbretes Wall Lizard		Arreu del Parc però més escassa als vessants vallesans. Freqüent.
Serp de Ferradura	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>	Culebra de herradura	Horseshoe Whip Snake		Dues cites conegudes en prats sabanoides i matollars oberts. Rara.
Serp d'Esculapi	<i>Zamenis longissimus</i>	Culebra de esculapio	Aesculapian Snake		Espècie en expansió des del Montnegre cap al sud de la serralada. A les zones més forestals i humides. És el límit meridional de la seva distribució a la Península Ibèrica. Rara.

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Serp blanca	<i>Zamenis scalaris</i>	Culebra de escalera	Ladder Snake		Arreu del Parc però menys abundant en zones amb ocupació humana. Frequent.
Colobra llisa meridional	<i>Coronella girondica</i>	Culebra lisa meridional	Southern Smooth Snake		Als hàbitats més mediterranis del Parc, tant boscosos com de brolles. Rara.
Serp de collaret	<i>Natrix astreptophora</i>	Culebra de collar	Grass snake		Espècie força lligada als boscos de ribera de les rieres i també a boscos caducifolis. Associada tant a punts naturals com artificials d'aigua. Més ben distribuïda que la serp d'aigua que depèn més d'ecosistemes aquàtics. Rara.
Serp d'aigua	<i>Natrix maura</i>	Culebra viperina	Viperine Water Snake		Lligada a punts naturals o artificials d'aigua. Més abundant al sector nord del Parc. Més aquàtica que la serp de collaret. Rara.
Serp verda	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Culebra bastarda	Montpellier Snake		Arreu del Parc. Frequent.
Escurçó pirinenc	<i>Vipera aspis</i>	Víbora áspid	Asp Viper		Una sola cita d'una espècie en expansió des del Montnegre cap al sud de la serralada. Rara.

6.4. Ocells

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Astor	<i>Accipiter gentilis</i>	Azor Común	Northern Goshawk	Resident		Arreu del Parc on hi hagi bosc extens. Hi ha 35 registres en època reproductora.
Esparver	<i>Accipiter nisus</i>	Gavilán Común	Eurasian Sparrowhawk	Resident		Arreu del Parc on hi hagi bosc. Hi ha 37 registres en època reproductora.
Mallerenga cuallarga	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mito	Long-tailed Tit	Resident		Arreu del Parc on hi hagi zones boscoses compactes o retalls forestals.
Perdiu roja	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz Roja	Red-legged Partridge	Resident		Zones obertes conreades del Parc.
Mussol comú	<i>Athene noctua</i>	Mochuelo Común	Little Owl	Resident		Zones obertes del Parc. Hi ha 70 registres en època reproductora.
Duc	<i>Bubo bubo</i>	Búho Real	Eagle Owl	Resident		Evita el sector central d'hegemonia forestal però ha nidificat i ha estat citat en zones perimetrals (Argentona, Òrrius, Vallromanes, etc.), també en pedreres. Hi ha 20 registres en època reproductora dins del Parc.
Aligot comú	<i>Buteo buteo</i>	Busardo Ratonero	Common Buzzard	Resident		Arreu del Parc, cria a les zones boscoses i s'alimenta, sobretot, en zones obertes. Hi ha 99 registres en època reproductora.
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	Goldfinch	Resident		Arreu del Parc, en zones obertes amb arbres esparsos.
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>	Verderón Común	Greenfinch	Resident		Arreu del Parc, en zones obertes amb arbres esparsos.
Raspinell comú	<i>Certhia brachydactyla</i>	Agateador Común	Short-toed Treecreeper	Resident		Arreu del Parc on hi hagin zones boscoses extenses o retalls forestals.
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>	Ruiseñor Bastardo	Cetti's Warbler	Resident		Torrents del Parc. Més abundant a la meitat inferior de les serres.
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>	Buitrón Ibérico	Zitting Cisticola	Resident		Espais oberts (erms, conreus, etc.) del Parc.
Durbec	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Picogordo	Hawfinch	Resident		Zones boscoses i humides del Parc. En expansió. Hi ha 26 registres en període reproductor.
Colom roquer	<i>Columba livia</i>	Paloma Bravía	Rock Pigeon	Resident		En urbanitzacions i algun mas del

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
						Parc
Tudó	<i>Columba palumbus</i>	Paloma Torcaz	Wood Pigeon	Resident		Arreu del Parc, zones boscoses i també des de fa uns 10-15 anys en zones urbanitzades amb arbres
Corb	<i>Corvus corax</i>	Cuervo Común	Common Raven	Resident		Nidificant probable als voltants de Céllecs. Hi ha 15 registres en període reproductor.
Picot garser gros	<i>Dendrocopos major</i>	Pico Picapinos	Great Spotted Woodpecker	Resident		Arreu del Parc, en zones boscoses i en expansió.
Picot garser petit	<i>Dendrocopos minor</i>	Pico Menor	Lesser Spotted Woodpecker	Resident		Actualment en expansió pels boscos de ribera més obacs i humits. Hi ha 54 registres en època reproductora
Cruixidell	<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	Corn Bunting	Resident		En camps i erms de Premià de Dalt i altres zones obertes de contacte entre el Maresme i el Vallès.
Sit negre	<i>Emberiza cia</i>	Escribano Montesino	Rock Bunting	Resident		Nidifica en zones amb pendent elevat i amb roques amb vegetació arbustiva. També és present en les etapes inicials després dels incendis forestals. Com a hivernant és molt més abundant, també en zones amb conreus arboris. Es troba en zones com el turó de Galzeran, Castellruf, Sant Mateu, el Pujolar o Matababres. Hi ha 13 cites en època reproductora.
Gratapalles	<i>Emberiza cirrus</i>	Escribano Soteño	Cirl Bunting	Resident		Arreu del Parc, però en zones obertes amb arbres. Evita les masses forestals tancades.
Pit-roig	<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo	European Robin	Resident		Arreu del Parc, sobretot en zones boscoses i més abundant quant més humit és el bosc.
Bec de corall senegalès	<i>Estrilda astrild</i>	Estrilda Común	Common Waxbill	Resident	Exòtica invasora	Al Mogent i als torrents i rieres més assolellades del Parc. Hi ha 66 cites en època reproductora.
Xoriguer comú	<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo Vulgar	Common Kestrel	Resident		Nidificació possible dins del Parc i segura als pobles del voltant del Parc que visiten zones obertes del Parc per trobar-hi aliment. Hi ha 158 registres en època reproductora.

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallineta Común	Moorhen	Resident		Algunes parelles al Mogent i basses de rec, embassaments o estanys naturalitzats. Hi ha 1 registre en època reproductora.
Gaig	<i>Garrulus glandarius</i>	Arrendajo Común	Eurasian Jay	Resident		Arreu del Parc, en zones forestals més o menys extenses.
Rossinyol del Japó	<i>Leiothrix lutea</i>	Ruiseñor del Japón	Red-billed Leiothrix	Resident	Exòtica invasora	Nidifica als alzinars i boscos de ribera de les obagues. Hi ha 110 registres en època reproductora.
Trencapinyes	<i>Loxia curvirostra</i>	Piquituerto Común	Red Crossbill	Resident		Ha criat en plantació de pi roig, fora del Parc però a prop (Urbanització Mas Llobart de Sant Fost de Campsentelles). Hi ha 3 registres en període reproductor.
Cotoliu	<i>Lullula arborea</i>	Totavía	Wood Lark	Resident		Mínim de tres poblacions en zones obertes i culminals. Hi ha 4 registres en període reproductor.
Merla blava	<i>Monticola solitarius</i>	Roquero Solitario	Blue Rock Thrush	Resident		Algunes parelles fan niu en pedreres en els límits del Parc i altres zones interiors (Coll de Font de Cera). Hi ha 20 registres en període reproductor.
Cuereta blanca	<i>Motacilla alba</i>	Lavandera Blanca Común	White Wagtail	Resident		Arreu del Parc, sobretot en zones obertes (pastures, conreus, etc) o urbanitzades. Evita les zones boscoses tancades.
Cuereta torrentera	<i>Motacilla cinerea</i>	Lavandera Cascadeña	Grey Wagtail	Resident		En torrents obacs i frescals del Parc. Hi ha 5 registres en època reproductora.
Cotorreta de pit gris	<i>Myiopsitta monachus</i>	Cotorra Argentina	Monk Parakeet	Resident	Exòtica invasora	Zones humanitzades sense boscos extensos. Hi ha 36 registres en període de nidificació. Pot ser d'animals que cerquin material vegetal per bastir nius dins i/o fora del Parc.
Mallerenga petita	<i>Parus ater</i>	Carbonero Garrapinos	Coal Tit	Resident		Espècie força lligada a les pinedes del Parc i escassa a l'alzinar muntanyenc. Absent en suredes i alzinars litorals.
Mallerenga blava	<i>Parus caeruleus</i>	Herrillo Común	Blue Tit	Resident		Arreu del Parc, en zones boscoses

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
						tancades i també obertes i és més abundant en fondals i obagues que en solells.
Mallerenga emplomallada	<i>Parus cristatus</i>	Herrerillo Capuchino	Crested Tit	Resident		Arreu del Parc on hi hagi zones boscoses compactes o retalls de bosc.
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>	Carbonero Común	Great Tit	Resident		Arreu del Parc, en zones boscoses tancades i també obertes.
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión Común	House Sparrow	Resident		A les masies i zones urbanitzades. Absent de les zones forestals extenses.
Pardal xarrec	<i>Passer montanus</i>	Gorrión Molinero	Eurasian Tree Sparrow	Resident		A les masies i zones urbanitzades. Fa el niu en cavitats d'edificis però també en talussos terrosos, roques i arbres.
Faisà	<i>Phasianus colchicus</i>	Faisán Vulgar	Common Pheasant	Resident	Exòtica	En valls interiors del Parc amb camps associats.
Cotxa fumada	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Colirrojo Tizón	Black Redstart	Resident		Va colonitzar el Maresme començant per les pedreres però ara ja cria a rocams naturals i masos i pobles d'arreu de la comarca.
Garsa	<i>Pica pica</i>	Urraca	Black-billed Magpie	Resident		Als camps i zones urbanitzades del Parc. Defuig els boscos tancats.
Picot verd	<i>Picus viridis</i>	Pito Real	Green Woodpecker	Resident		Arreu del Parc, sobretot en ecosistemes agroforestals i, per tant, més abundant a la perifèria.
Cotorra de Kramer	<i>Psittacula krameri</i>	Periquito de Collar	Rose-ringed Parakeet	Resident	Exòtica invasora	Zones humanitzades amb arbres grossos amb forats per fer-hi el niu. Hi ha 37 registres en període de nidificació. Es desconeix si sobrevolaven la zona o si feien niu en algun arbre de port elevat.
Rascló	<i>Rallus aquaticus</i>	Rascón Europeo	Water Rail	Resident		Ha criat al Mogent però no de forma regular i sempre en nombre escàs.
Bruei	<i>Regulus ignicapilla</i>	Reyezuelo Listado	Firecrest	Resident		Arreu del Parc amb coberta forestal, tant en boscos mediterranis com eurosiberians.
Teixidor	<i>Remiz pendulinus</i>	Pájaro Moscón	Penduline-Tit	Resident		S'ha observat a la riba del Mogent en període nidificant. Hi ha 1 registre en època reproductora.

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Bitxac comú	<i>Saxicola torquata</i>	Tarabilla Común	Common Stonechat	Resident		Cria en espais oberts i és present a les brolles del sector meridional del Parc. Hi ha 35 registres en període reproductor.
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	European Serin	Resident		Zones obertes amb arbres. També prop de masos i zones urbanitzades. Evita les masses forestals tancades.
Pica-soques blau	<i>Sitta europaea</i>	Trepador Azul	Wood Nuthatch	Resident		Arreu del Parc on hi hagi coberta forestal però més abundant en zones culminals i obagues frescals. En expansió.
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola Turca	Eurasian Collared Dove	Resident		A les masies i zones urbanitzades del Parc. Absent a les zones forestals tancades.
Gamarús	<i>Strix aluco</i>	Cárabo Común	Tawny Owl	Resident		Arreu del Parc, també en zones urbanitzades amb arbres de port notable.
Estornell negre	<i>Sturnus unicolor</i>	Estornino Negro	Spotless Starling	Resident		A la zona de contacte entre la plana del Vallès o la terra baixa del Maresme amb la base de la serralada. Hi ha 30 registres en època reproductora.
Estornell vulgar	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino Pinto	Common Starling	Resident		A les masies i zones urbanitzades del Parc.
Tallarol de casquet	<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca Capirotada	Blackcap	Resident		Arreu del Parc, sobretot en alzinars i boscos de ribera.
Tallarol capnegre	<i>Sylvia melanocephala</i>	Curruca Cabecinegra	Sardinian Warbler	Resident		A les brolles i màquies del Parc, més abundant als solells eixuts. Defuig ambients humits sense cobertura arbustiva.
Tallareta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>	Curruca Rabilarga	Dartford Warbler	Resident		En brolles assolellades i molt denses com les del Turó de Mates, castell de Sant Miquel o Sant Mateu.
Cargolet	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Chochín	Wren	Resident		Arreu del Parc. Més abundant en marges arbustius i vegetació de ribera.
Merla	<i>Turdus merula</i>	Mirlo Común	Blackbird	Resident		A les zones forestals o agroforestals del Parc.
Tord comú	<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal Común	Song Thrush	Resident		Zones forestals amb preferència pels boscos de ribera humits.

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Griva	<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal Charlo	Mistle Thrush	Resident		En ambients oberts amb arbres. Hi ha 22 registres en època reproductora.
Òliba	<i>Tyto alba</i>	Lechuza Común	Barn Owl	Resident		En zones obertes del Parc amb masos o construccions humanes.
Balquer	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Carricero Tordal	Great Reed Warbler	Estival reproductor		Ha criat a les ribes del Mogent entre Montornès i la Roca on és més abundant que la boscarla de canyar. S'han arribat a comptar-hi fins a 29 parelles en tot el tram.
Boscarla de canyar	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Carricero Común	Reed Warbler	Estival reproductor		Ha criat a les ribes del Mogent entre Montornès i la Roca de forma irregular i en baix nombre (1-3 parelles). Hi ha 3 registres en període reproductor.
Ànec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	Azulón	Mallard	Estival reproductor		Al Mogent. Pot criar també en basses grans ornamentals o de rec. Hi ha 7 registres en època reproductora.
Enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras Gris	European Nightjar	Estival reproductor		Arreu del Parc, en zona forestal. Hi ha 27 registres en època reproductora.
Siboc	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Chotacabras Pardo	Red-necked Nightjar	Estival reproductor		En boscos que prefereix orientats a migdia, més comú al vessant litoral.
Passerell	<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo Común	Linnet	Estival reproductor		Cria en algunes brolles, sobretot del cantó vallesà (Turó de Galzeran, castell de Sant Miquel, etc.). Hi ha 42 registres en època reproductora.
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	Chorlitejo Chico	Little Ringed Plover	Estival reproductor		Nidifica al Mogent de forma irregular.
Àguila marcenca	<i>Circaetus gallicus</i>	Culebrera Europea	Short-toed Eagle	Estival reproductor		Poques parelles reproductores però que es poden observar arreu del Parc. Hi ha 51 registres en època reproductora dins del Parc.
Cucut reial	<i>Clamator glandarius</i>	Críalo Español	Great Spotted Cuckoo	Estival reproductor		Zones obertes amb arbres esparsos. En declivi acusat.
Cucut	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco Europeo	Common Cuckoo	Estival reproductor		Arreu del Parc a les zones obertes envoltades d'arbres esparsos o masses forestals.
Hortolà	<i>Emberiza hortulana</i>	Escribano Hortelano	Ortolan Bunting	Estival reproductor		Hi ha 6 registres en època reproductora. L'espècie ha criat

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
						també a prop del Parc, a la Coscollada.
Falcó mostatxut	<i>Falco subbuteo</i>	Alcotán Europeo	Eurasian Hobby	Estival reproductor		Nidificant possible a bona part de la superfície boscosa del Parc. Visita nuclis urbans on troba aliment. Hi ha 12 cites en període reproductor dins del Parc.
Pinsà comú	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón Común	Chaffinch	Estival reproductor		Arreu de les zones boscoses del Parc, cada cop més abundant i s'estén vers cotes més baixes.
Bosqueta vulgar	<i>Hippolais polyglotta</i>	Zarcero Común	Melodious Warbler	Estival reproductor		Arreu del Parc, en zones obertes amb arbustos i arbres. També en bardisses i marges arbustius.
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina Común	Barn Swallow	Estival reproductor		Fa el niu en masos i cases d'urbanitzacions, tant a les valls com en els vessants muntanyencs.
Colltort	<i>Jynx torquilla</i>	Torcecuello	Wryneck	Estival reproductor		En boscos mediterranis i submediterranis i zones agroforestals. Hi ha 18 registres en època reproductora.
Botxí meridional	<i>Lanius meridionalis</i>		Southern Grey Shrike	Estival reproductor		En zones obertes (brolles, camps, etc.) del Turó de Mates, Sant Mateu i rodalies d'Argentona o Teià. Hi ha 1 registre en època reproductora.
Capsigrany	<i>Lanius senator</i>	Alcaudón Común	Woodchat Shrike	Estival reproductor		En brolles i zones agrícoles i, per tant, més abundant als vessants litorals que als vallesans. Hi ha 7 registres en època reproductora.
Rossinyol	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ruiseñor Común	Rufous Nightingale	Estival reproductor		Arreu del Parc excepte en els boscos més densos i tancats.
Abellerol	<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco Común	European Bee-eater	Estival reproductor		Hi ha nuclis reproductors a les valls de Sant Fost, Martorelles, Vallromanes, Alella o Argentona.
Cuereta groga	<i>Motacilla flava</i>	Lavandera Boyera	Blue-headed Wagtail	Estival reproductor		Ha criat a la plana al·luvial del Mogent entre la Roca i Montornès.
Papamosques gris	<i>Muscicapa striata</i>	Papamoscas Gris	Spotted Flycatcher	Estival reproductor		Zones obertes i humanitzades del Parc i del seu perímetre. Més abundant als sectors meridional. Hi ha 29 registres en època reproductora.

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Oriol	<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola Europea	Golden Oriole	Estival reproductor		A l'entorn de rius i rieres, en els boscos de ribera que els acompanyen. A vegades també a l'interior de zones boscoses envoltades de zones agrícoles.
Xot	<i>Otus scops</i>	Autillo Europeo	Eurasian Scops Owl	Estival reproductor		Resseguint les rieres i torrents del Parc, amb camps i altres boscos a prop. Absent a les zones forestals tancades.
Aligot vesper	<i>Pernis apivorus</i>	Abejero Europeo	European Honey-Buzzard	Estival reproductor		A l'obaga del Parc.
Cotxa cua-roja	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Colirrojo Real	Common Redstart	Estival reproductor		Va criar a la pedrera de Santa Maria de Martorelles (1985). Hi ha 4 registres en període reproductor.
Mosquiter pàl·lid	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquitero Papialbo	Western Bonelli's Warbler	Estival reproductor		Arreu del Parc, en boscos mediterranis i submediterranis. En expansió.
Mosquiter comú	<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero Común	Northern Chiffchaff	Estival reproductor		Nidifica a les zones més obagues i frescals del Parc com el torrent d'en Cuquet. Hiverna, en canvi, arreu del Parc.
Tórtora	<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola Común	Turtle Dove	Estival reproductor		A les zones obertes del Parc amb arbres.
Tallarol gros	<i>Sylvia borin</i>	Curruca Mosquitera	Garden Warbler	Estival reproductor		Parts culminals, obagues i torrents humits. Hi ha 15 dades en període reproductor dins del Parc.
Tallarol de garriga	<i>Sylvia cantillans</i>	Curruca Carrasqueña	Subalpine Warbler	Estival reproductor		A les màquies i brolles del Parc. Absent dels boscos tancats.
Tallarol emmascarat	<i>Sylvia hortensis</i>	Curruca Mirlona	Western Orphean Warbler	Estival reproductor		Molt localitzat en camps arbrats i màquies, sobretot al vessant marítim entre Tiana i Premià de Dalt. Hi ha 11 registres en època reproductora.
Puput	<i>Upupa epops</i>	Abubilla	Hoopoe	Estival reproductor		En zones obertes del Parc.
Alosa	<i>Alauda arvensis</i>	Alondra Común	Sky Lark	Hivernant		
Blauet	<i>Alcedo atthis</i>	Martín Pescador	Common Kingfisher	Hivernant		
Titella	<i>Anthus pratensis</i>	Bisbita Común	Meadow Pipit	Hivernant		
Grasset de muntanya	<i>Anthus spinoletta</i>	Bisbita Alpino	Water Pipit	Hivernant		
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>	Garza Real	Grey Heron	Hivernant		
Esplugabous	<i>Bubulcus ibis</i>	Garcilla Bueyera	Cattle Egret	Hivernant		

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Lluer	<i>Carduelis spinus</i>	Lúgano	Siskin	Hivernant		
Gavina vulgar	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Gaviota Reidora	Black-headed Gull	Hivernant		
Esparver d'estany	<i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho Pálido	Hen Harrier	Hivernant		
Gralla	<i>Corvus monedula</i>	Grajilla Común	Eurasian Jackdaw	Hivernant		
Verderola	<i>Emberiza citrinella</i>	Escribano Cerillo	Yellowhammer	Hivernant		
Repicatalons	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Escribano Palustre	Reed Bunting	Hivernant		
Falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>	Halcón Peregrino	Peregrine Falcon	Hivernant		Hi ha 12 registres en època reproductora. També s'observa de pas i com a hivernant a vegades en algun nucli urbà del perímetre del Parc.
Pinsà mec	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinzón Real	Brambling	Hivernant		
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>	Cogujada Común	Crested Lark	Hivernant		En zones agrícoles com les vinyes de Santa Maria de Martorelles. Tan sols 1 registre en època reproductora.
Becadell comú	<i>Gallinago gallinago</i>	Agachadiza Común	Common Snipe	Hivernant		
Gavina capnegra	<i>Larus melanocephalus</i>	Gaviota Cabecinegra	Mediterranean Gull	Hivernant		
Gavià argentat de potes grogues	<i>Larus michahellis</i>	Gaviota Patiamarilla	Yellow-legged Gull	Hivernant		
Cotxa blava	<i>Luscinia svecica</i>	Ruiseñor Pechiazul	Bluethroat	Hivernant		
Becadell sord	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Agachadiza Chica	Jack Snipe	Hivernant		
Pardal roquer	<i>Petronia petronia</i>	Gorrión Chillón	Rock Sparrow	Hivernant		En roquissers i masos. Hi ha 1 dada en període reproductor.
Cercavores	<i>Prunella collaris</i>	Acentor Alpino	Alpine Accentor	Hivernant		
Pardal de bardissa	<i>Prunella modularis</i>	Acentor Común	Dunnock	Hivernant		Zones agroforestals, arbustives i algunes zones urbanitzades. Hi ha 9 registres en període reproductor.
Roquerol	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Avión Roquero	Crag Martin	Hivernant		Nidifica a pedreres del perímetre del Parc i darrerament està colonitzant zones urbanes. Hi ha 8 registres en època reproductora al Parc que poden ser exemplars que hi fan niu o que proveniuen de les rodalies.

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Pinsà borroner	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Camachuelo Común	Bullfinch	Hivernant		
Reietó	<i>Regulus regulus</i>	Reyezuelo Sencillo	Goldcrest	Hivernant		
Becada	<i>Scolopax rusticola</i>	Chocha Perdiz	Eurasian Woodcock	Hivernant		
Pela-roques	<i>Tichodroma muraria</i>	Treparriscos	Wallcreeper	Hivernant		
Tord ala roig	<i>Turdus iliacus</i>	Zorzal Allirojo	Redwing	Hivernant		
Griva cerdana	<i>Turdus pilaris</i>	Zorzal Real	Fieldfare	Hivernant		
Merla de pit blanc	<i>Turdus torquatus</i>	Mirlo Capiblanco	Ring Ouzel	Hivernant		
Fredeluga	<i>Vanellus vanellus</i>	Avefría Europea	Northern Lapwing	Hivernant		
Falciot negre	<i>Apus apus</i>	Vencejo Común	Common Swift	Estival no reproductor		Cria en els nuclis urbans dels pobles i ciutats que envolten el Parc.
Ballester	<i>Apus melba</i>	Vencejo Real	Alpine Swift	Estival no reproductor		
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>	Avión Común	House Martin	Estival no reproductor		Cria als nuclis urbans a prop del Parc i absent com a nidificant a les zones altes i boscoses.
Oreneta cuarogenga	<i>Hirundo daurica</i>	Golondrina Dáurica	Red-rumped Swallow	Estival no reproductor		Algunes parelles en viaductes, túnels i desguassos del perímetre del Parc. En expansió. Hi ha 15 registres en període reproductor.
Xivitona vulgar	<i>Actitis hypoleucos</i>	Andarríos Chico	Common Sandpiper	De pas		
Voltor negre	<i>Aegypius monachus</i>	Buitre Negro	Black Vulture	De pas		
Agapornis de coll rosa	<i>Agapornis roseicollis</i>	Inseparable de Namíbia	Rosy-faced Lovebird	De pas	Exòtica	
Oca d'Egipte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Ganso del Nilo	Egyptian Goose	De pas	Exòtica invasora	
Múnia roig	<i>Amandava amandava</i>	Bengalí Rojo	Red Avadavat	De pas	Exòtica invasora	
Oca comuna	<i>Anser anser</i>	Ánsar Común	Greylag Goose	De pas		
Trobat	<i>Anthus campestris</i>	Bisbita Campestre	Tawny Pipit	De pas		
Piula dels arbres	<i>Anthus trivialis</i>	Bisbita Arbóreo	Tree Pipit	De pas		
Falciot pàl·lid	<i>Apus pallidus</i>	Vencejo Pàlido	Pallid Swift	De pas		
Àguila daurada	<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila Real	Golden Eagle	De pas		
Àguila pomerània	<i>Aquila pomarina</i>	Águila Pomerana	Lesser Spotted Eagle	De pas		
Aratinga mitrada	<i>Aratinga mitrata</i>	Aratinga Mitrada	Mitred Parakeet	De pas	Exòtica	
Agró roig	<i>Ardea purpurea</i>	Garza Imperial	Purple Heron	De pas		
Mussol emigrant	<i>Asio flammeus</i>	Lechuza Campestre	Short-eared Owl	De pas		

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Mussol banyut	<i>Asio otus</i>	Búho Chico	Long-eared Owl	De pas		
Cigonya blanca	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña Común	White Stork	De pas		
Cigonya negra	<i>Ciconia nigra</i>	Cigüeña Negra	Black Stork	De pas		
Arpella vulgar	<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho Lagunero Occidental	Marsh Harrier	De pas		
Arpella pàl·lida russa	<i>Circus macrourus</i>	Aguilucho Papialbo	Pallid Harrier	De pas		
Esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho Cenizo	Montagu's Harrier	De pas		
Xixella	<i>Columba oenas</i>	Paloma Zurita	Stock Pigeon	De pas		
Gaig blau	<i>Coracias garrulus</i>	Carraca Europea	European Roller	De pas		
Cornella negra	<i>Corvus corone</i>	Corneja Negra	Carrion Crow	De pas		Hi ha 2 registres en època reproductora
Guatlla	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz Común	Common Quail	De pas		
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>	Garceta Común	Little Egret	De pas		
Esparver d'espàtles negres	<i>Elanus caeruleus</i>	Elanio Azul	Black-winged Kite	De pas		
Bec de corall cuanegre	<i>Estrilda troglodytes</i>	Estrilda Culinegra	Black-rumped Waxbill	De pas	Exòtica invasora	
Esmerla	<i>Falco columbarius</i>	Esmerejón	Merlin	De pas		
Falcó de la Reina	<i>Falco eleonora</i>	Halcón de Eleonora	Eleonora's Falcon	De pas		
Falcó cama-roig	<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo Patirrojo	Red-footed Falcon	De pas		
Papamosques de collar	<i>Ficedula albicollis</i>	Papamoscas Collarino	Collared Flycatcher	De pas		
Mastegatàtxes	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papamoscas Cerrojillo	Pied Flycatcher	De pas		
Fotja vulgar	<i>Fulica atra</i>	Focha Común	Common Coot	De pas		
Grua	<i>Grus grus</i>	Grulla Común	Common Crane	De pas		
Voltor comú	<i>Gyps fulvus</i>	Buitre Leonado	Eurasian Griffon Vulture	De pas		
Àguila calçada	<i>Hieraetus pennatus</i>	Aguililla Calzada	Booted Eagle	De pas		
Bosqueta icterina	<i>Hippolais icterina</i>	Zarcero Icterino	Icterine Warbler	De pas		
Bosqueta pàl·lida occidental	<i>Iduna opaca</i>	Zarcero Bereber	Isabelline Warbler	De pas		
Pinsà roig becvermell	<i>Lagonosticta senegala</i>	Amaranta Senegalesa	Red-billed Firefinch	De pas	Exòtica	
Escorxador	<i>Lanius collurio</i>	Alcaudón	Red-backed Shrike	De pas		

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	FENOLOGIA	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
		Dorsirrojo				
Boscaler pintat gros	<i>Locustella naevia</i>	Buscarla Pintoja	Common Grasshoper-warbler	De pas		
Periquito	<i>Melopsittacus undulatus</i>	Periquito Común	Budgerigar	De pas	Exòtica	
Milà negre	<i>Milvus migrans</i>	Milano Negro	Black Kite	De pas		
Milà reial	<i>Milvus milvus</i>	Milano Real	Red Kite	De pas		
Merla roquera	<i>Monticola saxatilis</i>	Roquero Rojo	Rufous-tailed Rock-Thrush	De pas		
Aufrany	<i>Neophron percnopterus</i>	Alimoche Común	Egyptian Vulture	De pas		
Martinet de nit	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinete Común	Night Heron	De pas		
Cacatua de les nimfes	<i>Nymphicus hollandicus</i>	Cacatúa Ninfa	Cockatiel	De pas	Exòtica	
Còlit ros	<i>Oenanthe hispanica</i>	Collalba Rubia	Black-eared Wheatear	De pas		
Còlit gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Collalba Gris	Northern Wheatear	De pas		
Àliga pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>	Aguila Pescadora	Osprey	De pas		
Paó comú	<i>Pavo cristatus</i>	Pavo Real Común	Indian Peafowl	De pas	Exòtica	
Corb mari gros	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorán Grande	Great Cormorant	De pas		
Batallaire	<i>Philomachus pugnax</i>	Combatiente	Ruff	De pas		
Flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamenco Común	Greater Flamingo	De pas		
Mosquiter de doble ratlla	<i>Phylloscopus inornatus</i>		Yellow-browed Warbler	De pas		
Mosquiter xiulaire	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Mosquitero Silbador	Wood Warbler	De pas		
Mosquiter de passa	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosquitero Musical	Willow Warbler	De pas		
Rasclet	<i>Porzana pusilla</i>	Mosquitero Blistado	Baillon's Crake	De pas		
Oreneta de ribera	<i>Riparia riparia</i>	Avión Zapador	Sand Martin	De pas		
Bitxac rorenc	<i>Saxicola rubetra</i>	Tarabilla Norteña	Whinchat	De pas		
Tallereta vulgar	<i>Sylvia communis</i>	Curruca Zarcera	Common Whitethroat	De pas		
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zampullín Común	Little Grebe	De pas		
Xivita	<i>Tringa ochropus</i>	Andarríos Grande	Green Sandpiper	De pas		

6.5. Rates pinyades

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Ratpenat de ferradura petit	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Murciélago pequeño de herradura	Lesser Horseshoe		Sector meridional (Cartoixa de Montalegre).
Ratpenat de ferradura mediterrani	<i>Rhinolophus euryale</i>	Murciélago mediterráneo de herradura	Mediterranean Horseshoe Bat		
Ratpenat d'aigua	<i>Myotis daubentonii</i>	Murciélago ratonero ribereño	Daubenton's Bat		
Ratpenat d'orelles dentades	<i>Myotis emarginatus</i>	Murciélago ratonero pardo	Geoffroy's Bat		
Ratpenat rater mitjà	<i>Myotis blythii</i>	Murciélago ratonero mediano	Lesser Mouse-eared Bat		
Nòctul petit	<i>Nyctalus leisleri</i>	Nóctulo pequeño	Leisler's Bat		
Pipistrel·la comuna	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Murciélago enano	Common Pipistrelle Bat		
Pipistrel·la nana	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Murciélago de Cabrera	Soprano Pipistrelle Bat		
Pipistrel·la de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Murciélago de Nathusius	Nathusius' Pipistrelle		Hi passa en migració
Pipistrel·la de vores clares	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Murciélago de borde claro	Kuhl's Pipistrelle Bat		
Ratpenat muntanyenc	<i>Hypsugo savii</i>	Murciélago montañero	Savi's Pipistrelle Bat		
Ratpenat dels graners	<i>Eptesicus serotinus</i>	Murciélago hortelano	Serotine Bat		
Orellut gris	<i>Plecotus austriacus</i>	Murciélago orejudo gris	Grey Long-eared Bat		
Ratpenat de cova	<i>Miniopterus schreibersi</i>	Murciélago de cueva	Schreibers' Bent-winged Bat		
Ratpenat cuallarg	<i>Tadarida teniotis</i>	Murciélago rabudo	European Free-tailed Bat		

6.6. Mamífers

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
Eriçó vulgar	<i>Erinaceus europaeus</i>	Erizo europeo	Western European Hedgehog		Arreu del Parc.
Eriçó clar	<i>Atelerix algirus</i>	Erizo moruno	North African Hedgehog		Als vessants més assolellats i oberts del Parc, també en zones obertes al voltant de masos.
Musaranya nana	<i>Suncus etruscus</i>	Musgaño enano	Pygmy White-toothed Shrew		Arreu del Parc, en zones assolellades amb herbes, matolls esparsos i arbres escassos
Musaranya comuna	<i>Crocidura russula</i>	Musaraña gris	White-toothed Shrew		Arreu del Parc.
Esquirol	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ardilla roja	Eurasian Red Squirrel		Arreu del Parc, més abundant en pinedes.
Rata cellarda	<i>Eliomys quercinus</i>	Lirón careto	Garden Dormouse		Zones forestals o pròximes a elles amb bona quantitat de roques on es pugui refugiar amb un bon tapís de fullaraca i amb poc recobriment herbaci. Rara al Parc.
Ratolí de bosc	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Ratón de campo	Long-tailed Field Mouse		Arreu del Parc
Rata negra	<i>Rattus rattus</i>	Rata negra	House Rat	Exòtica	A masos i boscos del Parc.
Rata comuna	<i>Rattus norvegicus</i>	Rata parda	Brown Rat	Exòtica	A urbanitzacions del perímetre del parc i altres zones habitades.
Ratolí domèstic	<i>Mus musculus</i>	Ratón casero	House Mouse		A masos i camps del Parc.
Ratolí mediterrani	<i>Mus spretus</i>	Ratón moruno	Western Mediterranean Mouse		En brolles i màquies del Parc.
Talpó roig	<i>Myodes glareolus</i>	Topillo rojo	Bank Vole		Sots i torrents frescats del vessant vallesà.
Talpó comú	<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Topillo mediterráneo	Mediterranean Pine Vole		Zones obertes.
Conill	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo	European Rabbit		Arreu del Parc.
Mostela	<i>Mustela nivalis</i>	Comadreja	Least Weasel		Arreu del Parc.
Visó americà	<i>Neovison vison</i>	Visón americano	American Mink	Exòtica invasora	Al Mogent i, probablement, amb incursions als torrents tributaris.
Fagina	<i>Martes foina</i>	Garduña	Beech Marten		Arreu del Parc.
Teixó	<i>Meles meles</i>	Tejón	Badger		Arreu del Parc.
Geneta	<i>Genetta genetta</i>	Gineta	Common Genet	Exòtica	Arreu del Parc.
Guineu	<i>Vulpes vulpes</i>	Zorro	Fox		Arreu del Parc.
Senglar	<i>Sus scrofa</i>	Jabalí	Wild Boar		Arreu del Parc.
Cabirol	<i>Capreolus capreolus</i>	Corzo	Roe Deer		Arreu del Parc on s'hi detectà per primera

NOM CATALÀ	NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM ANGLÈS	EXÒTICA/EXÒTICA INVASORA	DISTRIBUCIÓ APROXIMADA
					vegada l'any 2000.